

**9.17**

1)  $\ln(x)$  n'est défini que si  $x > 0$ .

En outre, le dénominateur ne doit pas s'annuler :  $x \neq 0$ .

C'est pourquoi, on conclut  $D_f = ]0; +\infty[$ .

2) Vu que  $D_f$  n'est pas symétrique, la fonction ne saurait être paire ou impaire.

$$3) \begin{array}{c|ccc} & 0 & - & 1 \\ \hline \ln(x) & | & 0 & + \\ x & | & + & + \\ \hline f & | & - & 0 & + \end{array}$$

$$4) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\ln(x)}{x} = \frac{\ln(0_+)}{0_+} = \frac{-\infty}{0_+} = -\infty$$

La fonction  $f$  admet  $x = 0$  comme asymptote verticale.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = \frac{\ln(+\infty)}{+\infty} = \frac{+\infty}{+\infty} : \text{indéterminé}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln(x))'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = \frac{1}{+\infty} = 0_+$$

La fonction  $f$  admet  $y = 0$  comme asymptote horizontale à droite.

$$\begin{aligned} 5) f'(x) &= \left( \frac{\ln(x)}{x} \right)' \\ &= \frac{(\ln(x))'x - \ln(x)(x)'}{x^2} \\ &= \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln(x) \cdot 1}{x^2} \\ &= \frac{1 - \ln(x)}{x^2} \end{aligned}$$

Étudions le signe du numérateur :

$$(a) 1 - \ln(x) = 0$$

$$1 = \ln(x)$$

$$e^1 = e^{\ln(x)}$$

$$e = x$$

$$(b) \begin{cases} \ln(x) < 1 & \text{si } x < e \\ \ln(x) = 1 & \text{si } x = e \\ \ln(x) > 1 & \text{si } x > e \end{cases} \iff \begin{cases} 0 < 1 - \ln(x) & \text{si } x < e \\ 0 = 1 - \ln(x) & \text{si } x = e \\ 0 > 1 - \ln(x) & \text{si } x > e \end{cases}$$

$$\begin{array}{c|ccc} & 0 & e & - \\ \hline 1 - \ln(x) & | & + & 0 & - \\ x^2 & | & + & | & + \\ \hline f' & | & + & 0 & - \\ f & | & \nearrow \max & | & \searrow \end{array}$$

$$f(e) = \frac{\ln(e)}{e} = \frac{1}{e}$$

Le point  $(e; \frac{1}{e})$  est un maximum global.

$$\begin{aligned} 6) \quad f''(x) &= \left( \frac{1 - \ln(x)}{x^2} \right)' \\ &= \frac{(1 - \ln(x))' x^2 - (1 - \ln(x))(x^2)'}{(x^2)^2} \\ &= \frac{(0 - \frac{1}{x}) x^2 - (1 - \ln(x)) \cdot 2x}{x^4} \\ &= \frac{-x - 2x + 2x \ln(x)}{x^4} \\ &= \frac{2x \ln(x) - 3x}{x^4} \\ &= \frac{x(2 \ln(x) - 3)}{x^4} \\ &= \frac{2 \ln(x) - 3}{x^3} \end{aligned}$$

Étudions le signe du numérateur :

$$(a) \quad 2 \ln(x) - 3 = 0$$

$$2 \ln(x) = 3$$

$$\ln(x) = \frac{3}{2}$$

$$e^{\ln(x)} = e^{\frac{3}{2}}$$

$$x = \sqrt{e^3}$$

$$\begin{aligned} (b) \quad &\begin{cases} \ln(x) < \frac{3}{2} & \text{si } x < \sqrt{e^3} \\ \ln(x) = \frac{3}{2} & \text{si } x = \sqrt{e^3} \\ \ln(x) > \frac{3}{2} & \text{si } x > \sqrt{e^3} \end{cases} \iff \begin{cases} 2 \ln(x) < 3 & \text{si } x < \sqrt{e^3} \\ 2 \ln(x) = 3 & \text{si } x = \sqrt{e^3} \\ 2 \ln(x) > 3 & \text{si } x > \sqrt{e^3} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 2 \ln(x) - 3 < 0 & \text{si } x < \sqrt{e^3} \\ 2 \ln(x) - 3 = 0 & \text{si } x = \sqrt{e^3} \\ 2 \ln(x) - 3 > 0 & \text{si } x > \sqrt{e^3} \end{cases} \end{aligned}$$

	0	$\sqrt{e^3}$
$2 \ln(x) - 3$	-	0
$x^3$	+	+
$f''$	-	0
$f$	\diagdown	\diagup

$$f(\sqrt{e^3}) = \frac{\ln(\sqrt{e^3})}{\sqrt{e^3}} = \frac{\ln(e^{\frac{3}{2}})}{\sqrt{e^3}} = \frac{\frac{3}{2}}{\sqrt{e^3}} = \frac{3}{2\sqrt{e^3}}$$

Le point  $(\sqrt{e^3}; \frac{3}{2\sqrt{e^3}})$  est un point d'inflexion.

7)

