


11.9



Les fonctions f et g sont paires :

$$f(-x) = \frac{1}{2}(-x)^2 = \frac{1}{2}x^2 = f(x) \quad \text{et} \quad g(-x) = |-x| = |x| = g(x)$$

$$\begin{aligned} \text{C'est pourquoi, } \text{aire}\left(\{(x; y) \in \mathbb{R}^2 : f(x) \leq y \leq g(x)\}\right) = \\ 2 \cdot \text{aire}\left(\{(x; y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0 \text{ et } f(x) \leq y \leq g(x)\}\right). \end{aligned}$$

Déterminons les abscisses des points d'intersection des graphes de f et de g lorsque $x \geq 0$:

$$\frac{1}{2}x^2 = |x|$$

$$\frac{1}{2}x^2 = x$$

$$0 = x - \frac{1}{2}x^2 = \frac{1}{2}x(2 - x)$$

$$x = 0 \text{ ou } x = 2$$

$$2 \cdot \left(\int_0^2 x \, dx - \int_0^2 \frac{1}{2}x^2 \, dx \right) = 2 \cdot \left(\int_0^2 \left(x - \frac{1}{2}x^2 \right) \, dx \right) = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 \Big|_0^2 \right) =$$

$$2 \cdot \left(\left(\frac{1}{2} \cdot 2^2 - \frac{1}{6} \cdot 2^3 \right) - \left(\frac{1}{2} \cdot 0^2 - \frac{1}{6} \cdot 0^3 \right) \right) = 2 \cdot \left(\left(2 - \frac{4}{3} \right) - (0 - 0) \right) = 2 \cdot \left(\frac{2}{3} - 0 \right) = 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$