

7.13


1) Soit $A(x; \frac{1}{4}x^2)$ un point du graphe de f .

La distance entre les points A et P vaut :

$$d(x) = \delta(A; P) = \|\overrightarrow{AP}\| = \left\| \begin{pmatrix} 0 - x \\ 3 - \frac{1}{4}x^2 \end{pmatrix} \right\| =$$

$$= \sqrt{(-x)^2 + (3 - \frac{1}{4}x^2)^2} = \sqrt{x^2 + 9 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{16}x^4}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{16}x^4 - \frac{1}{2}x^2 + 9}$$



Les conditions de l'énoncé stipulent que $D_d = D_f = [-3; 4]$.

2) Comme la fonction $x \mapsto x^2$ est croissante sur \mathbb{R}_+ , le problème revient à maximiser et à minimiser le carré de la distance entre les points A et P, c'est-à-dire la fonction $d^2(x) = \frac{1}{16}x^4 - \frac{1}{2}x^2 + 9$ sur l'intervalle $D_d = [-3; 4]$.

$$(d^2(x))' = (\frac{1}{16}x^4 - \frac{1}{2}x^2 + 9)' = \frac{1}{4}x^3 - x = \frac{1}{4}x(x^2 - 4) = \frac{1}{4}x(x+2)(x-2)$$

| | | | | |
|----------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | -2 | 0 | 2 | |
| $\frac{1}{4}x$ | - | 0 | + | + |
| $x+2$ | - | 0 | + | + |
| $x-2$ | - | - | - | 0 |
| $(d^2)'$ | - | 0 | + | 0 |
| d^2 | \searrow | \downarrow | \nearrow | \downarrow |
| | | min | max | min |

$$d(-2) = \sqrt{\frac{1}{16}(-2)^4 - \frac{1}{2}(-2)^2 + 9} = 2\sqrt{2}$$

$$d(0) = \sqrt{\frac{1}{16}0^4 - \frac{1}{2}0^2 + 9} = 3$$

$$d(2) = \sqrt{\frac{1}{16}2^4 - \frac{1}{2}2^2 + 9} = 2\sqrt{2}$$

$$d(-3) = \sqrt{\frac{1}{16}(-3)^4 - \frac{1}{2}(-3)^2 + 9} = \frac{3}{4}\sqrt{17}$$

$$d(4) = \sqrt{\frac{1}{16}2^4 - \frac{1}{2}2^2 + 9} = \sqrt{17}$$

3) Le point A est le plus près du point P si $x = -2$ ou si $x = 2$.

Les points du graphe de f les plus proches de P sont ainsi $(-2; f(-2)) = (-2; 1)$ et $(2; f(2)) = (2; 1)$.

Le point A est le plus loin du point P si $x = 4$.

Le point du graphe de f le plus éloigné de P est donc $(4; f(4)) = (4; 4)$.