

$$\begin{aligned}
&= r_1 x_3 + (b - r_1 q_2) y_3 = b \underbrace{y_3}_{x_2} + r_1 \underbrace{(x_3 - q_2 y_3)}_{y_2} \\
&= b x_2 + r_1 y_2 \\
&= b x_2 + (a - b q_1) y_2 = a \underbrace{y_2}_x + b \underbrace{(x_2 - q_1 y_2)}_y \\
&= a x + b y
\end{aligned}$$

- 3.9** À partir des calculs de l'exercice 3.6, déterminer des entiers x et y tels que :
- 1) $308x + 448y = 28$
 - 2) $120x + 264y = 24$

Théorème de Bachet de Méziriac

Soient a et b deux entiers relatifs non tous les deux nuls et $d = \text{pgcd}(a, b)$. L'ensemble des combinaisons linéaires entières de a et b coïncide avec l'ensemble des multiples de d :

$$\{ax + by : x, y \in \mathbb{Z}\} = \{kd : k \in \mathbb{Z}\}$$

- 3.10** Démontrer le théorème de Bachet de Méziriac :
- 1) Soient $x, y \in \mathbb{Z}$. Montrer que d divise $ax + by$.
 - 2) Soit $k \in \mathbb{Z}$. Montrer, à l'aide du théorème de Bézout, qu'il existe des entiers x et y tels que $ax + by = kd$.
- 3.11**
- 1) Soit $n \in \mathbb{Z}$.
 - (a) Simplifier $2(5n + 3) - 5(2n + 1)$.
 - (b) Que peut-on en déduire pour les entiers $5n + 3$ et $2n + 1$?
 - 2) Démontrer que les entiers a et b sont premiers entre eux :
 - (a) $a = -n + 4$ $b = 3n - 11$
 - (b) $a = 6n + 3$ $b = 3n + 1$
 - (c) $a = 2n - 1$ $b = -7n + 3$

- 3.12** Soient a et b deux entiers et $d = \text{pgcd}(a, b)$. Montrer que $\frac{a}{d}$ et $\frac{b}{d}$ sont premiers entre eux.

- 3.13** Soient p et q deux entiers non nuls. Démontrer qu'il existe deux entiers a et b tels que $\frac{1}{pq} = \frac{a}{p} + \frac{b}{q}$ si et seulement si p et q sont premiers entre eux.

Lemme de Gauss

Soient a, b, c des entiers non nuls. Si a divise bc et si a est premier avec b , alors a divise c .

- 3.14** Démontrer le lemme de Gauss grâce au théorème de Bézout.

Équations diophantiennes

Une *équation diophantienne* linéaire à deux variables est une équation de la forme $ax + by = c$ où $a, b, c \in \mathbb{Z}$ et dont les solutions doivent être entières.

Théorème de résolution des équations diophantiennes

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$, $d = \text{pgcd}(a, b)$ et l'équation diophantienne $ax + by = c$. Alors

- 1) si d ne divise pas c , l'équation diophantienne $ax + by = c$ n'a pas de solution.
- 2) si d divise c , l'équation diophantienne $ax + by = c$ a une infinité de solutions; de plus, si $(x_0; y_0)$ est une solution particulière, alors toutes les solutions sont données par $x = x_0 + \frac{b}{d}k$ et $y = y_0 - \frac{a}{d}k$ ($k \in \mathbb{Z}$).

3.15 Le but de cet exercice est de prouver le théorème de résolution des équations diophantiennes.

- 1) Prouver la contraposée de la première affirmation : si l'équation diophantienne $ax + by = c$ admet une solution, alors d divise c .
- 2) Supposons que d divise c .
 - (a) Montrer que le théorème de Bézout garantit l'existence d'une solution particulière : il existe des entiers x_0 et y_0 tels que $ax_0 + by_0 = c$.
 - (b) Vérifier que l'équation diophantienne $ax + by = c$ admet pour solution $x = x_0 + \frac{b}{d}k$ et $y = y_0 - \frac{a}{d}k$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.
 - (c) Il reste encore à montrer que toutes les solutions de l'équation diophantienne sont de cette forme. Soient $x, y \in \mathbb{Z}$ avec $ax + by = c$.
 - i. Puisque $ax_0 + by_0 = c$, vérifier que la soustraction de ces équations donne $a(x - x_0) = b(-y + y_0)$, puis $\frac{a}{d}(x - x_0) = \frac{b}{d}(-y + y_0)$.
 - ii. En déduire, grâce à l'exercice 3.12 et au lemme de Gauss, que $\frac{a}{d}$ divise $-y + y_0$.
 - iii. En conclure qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $y = y_0 - \frac{a}{d}k$.
 - iv. Après substitution dans l'équation $\frac{a}{d}(x - x_0) = \frac{b}{d}(-y + y_0)$, constater que $x = x_0 + \frac{b}{d}k$.

3.16 Déterminer toutes les solutions entières des équations suivantes :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1) $42x + 25y = 3$ | 2) $153x - 102y = 413$ |
| 3) $45x + 27y = 117$ | 4) $120x + 43y = 12$ |

3.17 Peut-on trouver sur la droite d'équation $35x + 84y = 150$ des points à coordonnées entières?

